NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

LEMSIP 500 poudre orale
Paracétamol 500 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 10 jours, consultez un médecin
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qu'est-ce que LEMSIP 500 poudre orale et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEMSIP 500 poudre orale ?
3. Comment prendre LEMSIP 500 poudre orale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEMSIP 500 poudre orale ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que LEMSIP 500 poudre orale et dans quel cas est-il utilisé ?

- Traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEMSIP 500 poudre orale ?

Ne prenez jamais LEMSIP
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans Lemsip.
- Si vous avez ou avez eu des atteintes hépatiques ou rénales sévères.
- Si vous souffrez de phénylcétonurie car ce médicament contient de l'aspartame.
- Si vous avez moins de 12 ans

Faites attention avec LEMSIP
- En cas d'insuffisance hépatique ou rénale légères à modérées.
- Si vous consommez de l'alcool, des barbituriques, certains médicaments contre l'épilepsie. Dans ces cas, l'accumulation de métabolites toxiques du paracétamol peut aggraver ou entraîner des lésions hépatiques.
- En cas de prise excessive, il y a risque d'atteinte hépatique.
- En cas de prise prolongée, il y a risque d'atteinte rénale.

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous, ou si elle l'a été dans le passé.

Prise d'autres médicaments

- Le Lemsip peut être pris en même temps que des antirhumatismaux ou des anticoagulants de type coumarinique. Cependant en cas d'utilisation concomitante supérieure à une semaine ou de prise de doses supérieures à 2 g, parlez-en à votre médecin.
- Ne pas prendre de Lemsip en même temps que des calmants à base de barbituriques ou certains antiépileptiques, sans avis médical. Eviter la prise simultanée d'alcool.
- Le paracétamol augmente l'élimination du chloramphénicol. Certaines méthodes d'analyse utilisées pour déterminer les taux de glucose et d'acide urique dans le sang peuvent être perturbées par la présence de paracétamol.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons
Sans objet

Grossesse et allaitement
Par mesure de prudence, on évitera la prise de Lemsip durant les 3 premiers mois de la grossesse.

Le Lemsip peut être pris pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet

Informations importantes concernant certains composants du Lemsip
L'usage du médicament doit être évité chez les patients souffrant de phénylcétonurie car il contient de l'aspartame qui est principalement hydrolysé en méthanol, acide aspartique et phénylalanine dans le tractus gastro-intestinal.

3. Comment prendre LEMSIP 500 poudre orale?

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est ;
Adultes et enfants au-delà de 12 ans :
Prenez de 1 à 2 sachets (500mg à 1g) toutes les 4 à 6 heures avec un maximum de 8 sachets (4g) par jour.

Ne pas administrer avant l'âge de 12 ans.
Ne pas utiliser Lemsip plus de 10 jours sans avis médical pour la douleur et 3 jours pour la fièvre.
Chez les alcooliques chroniques, la dose maximale de paracétamol est de 4 sachets (2g) par jour.

Mode d'emploi des sachets :
Verser le contenu du sachet dans un verre et remplir d'eau tiède ou chaude. Bien mélanger et sucrer si nécessaire.

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de Lemsip que vous n'auriez dû
Si vous avez pris trop de Lemsip, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245 245)

La prise en une fois de doses supérieures à celles conseillées à la rubrique « 3. Comment prendre LEMSIP 500 poudre orale ? » peut provoquer de graves lésions.
L'hospitalisation et le recours d'urgence à un médecin s'imposent toujours en cas d'intoxication connue ou suspectée, même en l'absence de symptômes, afin que les mesures nécessaires puissent être prises.

Des symptômes tels que nausées, vomissements et douleurs abdominales ne surviennent que plusieurs heures après l'intoxication.
La seule mesure à prendre à domicile, avant l'hospitalisation, est de donner 50 à 100 g de charbon activé.

Si vous oubliez de prendre Lemsip
Sans objet

Si vous arrêtez de prendre Lemsip
Sans objet

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, Lemsip peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Dans de rares cas, une éruption cutanée est possible.
Dans des cas très rares des réactions cutanées sévères ont été rapportées
A doses élevées le paracétamol peut provoquer des troubles hépatiques graves et des troubles rénaux graves lors d'utilisation prolongée.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver LEMSIP 500 poudre orale?

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Lemsip après la date de péremption mentionnée sur le carton et le sachet après « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

6. Informations supplémentaires.

Que contient Lemsip 500
- La substance active est le paracétamol

- Les autres composants (excipients) sont acide ascorbique, sucre, saccharose, acide citrique, citrate de sodium, arôme citron, aspartame, curcumine WD poudre (E100), saccharine sodique.

Qu'est-ce que Lemsip et contenu de l'emballage extérieur
Lemsip est une poudre jaunâtre pour usage oral.
Boîte de 5 et 10 sachets.

Titulaire de l'Autorisation de mise sure le marché et fabricant
Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le marché
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA
Allée de la Recherche, 20
1070 Bruxelles - Belgique

Fabricant
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7 DS, East Yorkhire
United Kingdom

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le marché :
BE352502

Médicament non soumis à prescription médicale

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 08/2014